

- 1 Масса тела менее 50 кг**
до достижения массы тела 50 кг
- 2 Возраст младше 20 лет**
для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза — до достижения 20 лет
- 3 Масса тела менее 70 кг**
для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза — до достижения массы тела 70 кг
- 4 Гемоглобин менее 140 г/л**
для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза — до достижения уровня гемоглобина 140 г/л
- 5 Температура тела выше 37 °C**
до нормализации температуры тела (37 °C и ниже)
- 6 Пульс менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту**
до нормализации пульса от 55 до 95 ударов в минуту
- 7 Артериальное давление: систолическое менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст.; диастолическое — менее 60 мм рт. ст. и более 89 мм рт. ст.**
до нормализации систолического давления: 90-149 мм рт. ст.; диастолического давления: 60-89 мм рт. ст.
- 8 Индекс массы тела — менее 18,5 и более 40**
- 9 Несовпадение результатов исследования группы крови АВ0, резус-принадлежности, антигенов С, с, Е, е, К с результатами исследования при предыдущей донации**
до выполнения подтверждающего исследования
- 10 Трансфузия крови и (или) ее компонентов**
120 календарных дней со дня трансфузии
- 11 Первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов**
до подтверждения отсутствия в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов, не ранее чем через 180 календарных дней после первичного выявления
- 12 Оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности**
120 календарных дней со дня оперативного вмешательства
- 13 Лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное)**
120 календарных дней с момента окончания процедур
- 14 Контакт с носителями и больными вирусным гепатитом В или С, сифилисом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)**
120 календарных дней после прекращения последнего контакта
- 15 Сомнительный результат на маркеры вирусного гепатита В и (или) вирусного гепатита С, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), и (или) на возбудителя сифилиса**
 - до подтверждения отсутствия маркеров вирусного гепатита В и (или) вирусного гепатита С, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)

- и (или) на возбудителя сифилиса, но не ранее чем через 120 календарных дней после получения сомнительного результата лабораторного исследования

16 Перенесенные инфекционные заболевания

малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и при наличии отрицательных результатов иммунологических тестов — 3 года

17 Брюшной тиф

после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств — 1 год

18 Ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция

30 календарных дней после выздоровления

19 Перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, не указанные в разделе 1 и 2 приложения №2 к настоящему приказу

120 календарных дней после выздоровления

20 Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации

30 календарных дней после купирования острого периода

21 Обострение язвы желудка и (или) двенадцатиперстной кишки

1 год с момента купирования острого периода

22 Болезни почек, не указанные в пункте 12 раздела 2 приложения №2 к настоящему приказу

1 год с момента купирования острого периода

23 Аллергические заболевания в стадии обострения

60 календарных дней после купирования острого периода

24 Период беременности, лактации

1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации

25 Вакцинация

- прививка инактивированными вакцинами (в том числе против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа), анатоксинами — 10 календарных дней после вакцинации
- прививка живыми вакцинами (в том числе против бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, полиомиелита перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции) — 30 календарных дней после вакцинации
- прививка рекомбинантными вакцинами (в том числе против вирусного гепатита В, коронавирусной инфекции) — 30 календарных дней после вакцинации
- введение иммуноглобулина против гепатита В — 120 календарных дней после вакцинации
- введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита — 120 календарных дней после вакцинации
- вакцинация против бешенства — 1 год после вакцинации

26 Прием лекарственных препаратов

- антибиотики — 14 календарных дней после окончания приема
- анальгетики, антикоагулянты, антиагреганты (в том числе салицилаты) — 3 календарных дня после окончания приема

27 Прием алкоголя

48 часов

28 Отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови

см. приложение №2 к Порядку прохождения донорами медицинского обследования — до достижения допустимых пределов значений показателей, но не ранее 30 календарных дней